

Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2024-05-21
 Godkänd av Medicinskt sakkunnig
 Version 2.0

MRSA-rutiner för slutenvård

Vid frågor, kontakta Vårdhygien dagtid eller infektionsläkare jourtid.

Alla patienter har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterad diagnos.

Risikfaktorer för smittspridning

- sår, hudinfektioner, eksem, fjällande hudkostym samt andra hudlesioner
- CVK, CDK, midline och PICC-line
- KAD och RIK
- stomier, dränage och PD-kateter
- nedsatt kognitiv förmåga

Vårdrutiner	
Tillämpa alltid Basala hygienrutiner och god hygienisk standard - Socialstyrelsen enligt Socialstyrelsens föreskrift: SOSFS 2015:10 samt Grundläggande vårdhygieniska rutiner i slutenvård Dessutom gäller nedanstående vådrutiner:	
Vårdplacering	Patienten ska isoleringsvårdas.
Provtagning/Diagnostik	Ta kompletterande MRSA-prov från näsa, svalg och perineum samt eventuella riskfaktorer vid nyupptäckt MRSA, se MRB - provtagning slutenvård
Patient	<ul style="list-style-type: none"> • Tillämpa god handhygien, eventuellt med personalens hjälp. • Patientkläder byts och sängen renbäddas en gång per dygn samt vid kontamination.
Punktdesinfektion	Misstänkt smittsamt material eller kroppsvätskor torkas upp direkt. Ytan bearbetas därefter mekaniskt med desinfektionsmedel.
Daglig städning	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfektera ytor med desinfektionsmedel. • Då gemensam dusch används städas den med desinfektionsmedel

<p>Slutlig smittstädning då patienten byter vårdplats inom avdelningen, avslutar isolering/kohortvård efter misstänkt eller konstaterad smitta eller skrivs ut från avdelningen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Slutlig smittstädning ska alltid föregås av daglig städning • Kassera engångsmaterial som förvarats i patientens rum och hygienutrymme. Gäller ej skyddsutrustning i förpackningar som handskar och förkläden. • Torka av behållare för tvål, handdesinfektion och torkpapper med desinfektionsmedel. • Skicka oanvänd tvätt som förvarats i patientens rum och hygienutrymme till tvätteriet. • Desinfektera ytor med desinfektionsmedel. • Städa golv i vådrum, sluss/förrum och hygienutrymme, inklusive dusch, med desinfektionsmedel, se Infektionsmanual – Snabbguide för slutenvård.
<p>Tvätt</p>	<p>Tvätt hanteras som risktvätt.</p>
<p>Besökare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Besökare bör utföra handdesinfektion före och efter besöket. • Hänvisa besökare till patientens vådrum. De bör inte vistas i allmänna patientutrymmen.
<p>Undersökning/behandling på annan enhet eller mottagning på sjukhus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Underrätta mottagande enhet om MRSA-bärarskapet i förväg. • Byt till rena patientkläder. • Täck sår och töm urin-, stomi- och dränagepåse. • Renbädda sängen. • Låt patienten desinfektera händerna.
<p>Överföring till annan vårdform</p>	<p>Bärarskap och eventuella riskfaktorer för smittspridning ska framgå i samband med vårdplanering eller överföring till annan vårdform.</p>
<p>Journalmärkning</p>	<p>Journalen märks under utropstecknet, välj antibiotikaresistenta bakterier. Avskrivning av MRSA-bärarskapet görs av infektionsklinikerna. Det finns ingen säker definition för avskrivning av bärarskap.</p>

Journalmärkning

Journalen märks under utropstecknet, välj antibiotikaresistenta bakterier. Avskrivning av MRSA-bärarskap görs av infektionsklinikerna.

Information MRSA

MRSA, Meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en antibiotikaresistent hudbakterie som främst orsakar hud- och mjukdelsinfektioner men även kan ge sepsis och spridning till kroppens inre organ. Bärarskap utan symtom förekommer på slemhinnor i näsa/svalg, perineum och på huden. MRSA är resistent mot samtliga penicilliner, cefalosporiner och

karbapenemer. I vården kan smittspridning ske med kontaktsmitta mellan personer, framför allt via händer men kan också ske via föremål som kontaminerats.

MRSA är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. MRSA-patient följs på infektionsklinik och bedöms avseende avskrivning av bärarskapet. MRSA-rutiner gäller så länge märkning finns i journal och PASIS. Det finns patientinformation och läkarinformation från [Smittskydd Skåne](#).