

Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2024-05-21
Godkänd av Medicinskt sakkunnig
Version 2.0

MRSA-provtagning i öppenvård

[Grundläggande vårdhygieniska rutiner](#) är de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning i vården. I öppenvård provtas enbart för Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). För övriga multiresistenta bakterier (MRB) bedöms smittrisken vara låg i denna typ av verksamhet.

Provtagning

Provtagning för MRSA behöver inte utföras vid enstaka mottagningsbesök och dagkirurgi. Detta utesluter inte att såroddling tas vid en klinisk infektion. Ta prov för MRSA om patienten har sår, bölder och andra hudinfektioner eller läckande eksem och andra hudlesioner under nedanstående förutsättningar:

Vård- och omsorgskontakter de senaste 6 månaderna

- Inneliggande vård på sjukhus, rehabilitering eller poliklinisk behandling såsom dialys, endoskopi, kirurgi eller sårvård utanför Norden
- Arbete inom vård och omsorg utanför Norden

Samhällskontakter de senaste 6 månaderna

- Sammanhängande vistelse utanför Norden i mer än 1 månad
- Befunnit sig i en flyktingsituation
- Nära kontakt med känd MRSA-bärare exempelvis i det egna hushållet.

Provtagningsanvisning

- Ta prov från sår/hudlesion

- Följ Mikrobiologens [provtagningsinstruktioner](#)
- Använd remiss [Multiresistenta bakterier/Hygien](#) och ange land vid utlandsvistelse och provtagningssorsak i anamnesrutan. Använd en remiss per prov.
- Vid pågående eller nyligen avslutad antibiotikabehandling kan nytt prov behöva tas efter två veckor

Alla patienter har, enligt hälso- och sjukvårdslagen, rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte förhindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterad diagnos.