



# Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2024-05-21  
 Godkänd av Medicinskt sakkunnig  
 Version 2.0

## MRB – översikt vårdplacering och riskfaktorer

Kontakta Vårdhygien dagtid eller infektionsläkare jourtid vid frågor. Då ovanstående vårdplacering inte kan följas rekommenderas avvikelserapportering. Utökade hygien-/städrutiner måste tas i beaktande. För riskfaktorer, se nedan

	<b>Isoleringsvård</b> Vård på eget rum med egen toalett och helst egen dusch. Patienten vistas på rummet och får inte vara i gemensamma utrymmen. Sluss krävs inte.	<b>Enkelrumsvård</b> Vård på eget rum med egen toalett och helst egen dusch. Vistelse utanför rummet kan övervägas om patienten kan tillämpa god handhygien.	<b>Samvård</b> Vård tillsammans med andra patienter.
<b>Misstänkt MRB</b> <b>MRSA</b> <b>ESBL<sub>CARBA</sub></b> <b>Karbapenemresistenta</b> <b>Acinetobacter</b>	Isoleringsvård oavsett riskfaktorer för smittspridning		
<b>VRE</b>	Patienter <b>med</b> riskfaktorer för smittspridning	Patienter <b>utan</b> riskfaktorer för smittspridning	
<b>ESBL</b> - E.coli - Klebsiella pneumoniae - Proteus mirabilis	Patienter med diarré	Patienter med läckage från riskfaktorer för smittspridning	Övriga patienter
<b>Multiresistenta Pseudomonas aeruginosa</b>	Patienter <b>med</b> riskfaktorer för smittspridning		Patienter <b>utan</b> riskfaktorer för smittspridning

## Provtagning för MRB ska utföras vid inläggning enligt nedan:

- inför ineliggande vård på sjukhus
- vid återkommande avancerad poliklinisk behandling, till exempel dialys, sårbehandling och medicinska behandlingar inom dagsjukvård.

Provtagning behövs inte vid enstaka mottagningsbesök, dagkirurgi och endoskopi. Grundläggande vårdhygieniska rutiner bedöms vara tillräckliga för att förhindra smittspridning.

## Vård- och omsorgskontakter de senaste 6 månaderna

- Inneliggande vård på sjukhus, rehabilitering eller poliklinisk behandling såsom dialys, endoskopi, kirurgi eller sårvård utanför Norden
- Inneliggande vård på sjukhus med utbrott av MRB inom Norden. Se [Pågående utbrott](#) på Vårdhygiens hemsida. Provta enbart för aktuell MRB
- Arbete inom vård och omsorg utanför Norden

## Samhällskontakter de senaste 6 månaderna

- Sammanhängande vistelse utanför Norden i mer än 1 månad
- Befunnit sig i en flyktingsituation
- Nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis i det egna hushållet. Provta enbart för MRSA

## Riskfaktorer för spridning av respektive MRB

### MRSA

- sår, hudinfektioner, eksem, fjällande hudkostym samt andra hudlesioner
- CVK, CDK och PICC-line
- KAD och RIK
- stomier, dränage och PD-kateter
- nedsatt kognitiv förmåga

### Resistenta tarmbakterier med ESBL, ESBLCARBA samt VRE

- diarré
- urin- och faecesinkontinens
- stomier, dränage och PD-kateter
- KAD eller RIK
- kroniska sår
- nedsatt kognitiv förmåga

### Multiresistenta Pseudomonas aeruginosa

- kroniska sår
- stomier, dränage och PD-kateter
- tracheostomi och produktiv hosta
- CVK, CDK och PICC-line
- KAD eller RIK
- nedsatt kognitiv förmåga

## Karbapenemresistenta acinetobacter

- kroniska sår
  - stomier, dränage och PD-kateter
  - sår, hudinfektioner, eksem, fjällande hudkostym
- diarré
  - CVK, CDK och PICC-line
  - KAD och RIK
  - nedsatt kognitiv förmåga